



Requisitos de Vacunación para el año escolar 2016-2017

Primera dosis de Sarampión, Paperas y Rubeola (MMR) debe ser en/ o después de 12 meses de edad.

Pre-Kinder

- 4 de DTaP (Difteria, Tétano y Tos Ferina)
- 3 de Polio
- 3 o 4 HIB (Haemophilus influenza tipo b) o 1 HIB después de 15 meses de edad
- 1 de Sarampión* debe ser después de los 12 meses de edad
- 1 de Paperas* debe ser después de los 12 meses de edad
- 1 de Rubeola* debe ser después de los 12 meses de edad
- 3 de Hepatitis B (la última dosis debe ser después de los 6 meses de edad)
- 1 de Varicela (niños nacidos en o/después Abril 1, 2001). Debe ser dado en o/después de 12 meses de edad.

Kínder hasta 5to

NOTA: La HIB no es requerida después de los 5 años de edad

- 4 o 5 de DTP/DTaP (la última dosis debe ser en /o después del 4to cumpleaños)
- 4 de Polio (4ta dosis en/o después del 4to cumpleaños)
- 2 de Sarampión* (1ra dosis debe ser en/o después de los 12 meses de edad)
- 2 Paperas* (1ra dosis debe ser en/o después de los 12 meses de edad, 2^{nda} dosis para estudiantes que entran a la escuela por primera vez en/o después de Julio 1,2008)
- 1 de Rubeola* (1ra dosis debe ser en/o después de los 12 meses de edad)
- 3 de Hepatitis B (última dosis debe ser colocada después de los 6 meses de edad)
- 2 de Varicela (niños nacidos en/o después del 1 de Abril, 2001). La primera dosis debe ser colocada en/o después de los 12 meses de edad.

6to a 12

- 4 o 5 de DTP/DTaP** (la última dosis debe ser en /o después del 4to cumpleaños)
- 1 de Tdap (dosis de refuerzo es requerida para estudiantes que entren al 7to grado o tengan 12 años de edad si no han sido documentados anteriormente)
- 3 o 4 de Polio (3 si es la última dosis en/ o después del 4to cumpleaños)
- 2 de Sarampión* (1^{ra} dosis debe ser en/o después de los 12 meses de edad)
- 2 de Paperas* (1^{ra} dosis debe ser en/ o después de 12 meses de edad, 2da dosis para estudiantes que entren a la escuela por primera vez en / o después de Julio 1, 2008)
- 1 de Rubeola* (1^{ra} dosis debe ser en/ o después de 12 meses de edad)
- 3 de Hepatitis B (para estudiantes nacidos en/o después de Julio 1,1994)
- 1 de Varicela (Niños nacidos en/o después de Abril 1, 2001). Deben ser dadas en/ o después de 12 meses de edad.
- 1 de MCV (virus meningococcal) (1ra dosis para estudiantes entrando al 7mo grado o a por los 12 meses de edad)

*Generalmente se anunciara como MMR en un registro de vacunas.

** Los estudiantes que comenzaron las vacunas después de los 7 años se les dará la Td/Tdap en lugar de DTAP y se requieren solamente 3 dosis.

NOTA: La ley de Carolina del Norte permite dosis inadvertidamente administradas 4 días o menos antes de la minoría de edad requerida/ intervalos para ser aceptado. Las dosis administradas 5 días o mas antes de la edad mínima/intervalos deben ser repetidos.

Combinación DE VACUNAS

Comvax = HIB y Hepatitis B

Pediarix = DTaP, Hepatitis B y Polio

Pentacel = DTaP, HIB y Polio

TriHibit = DTaP y HIB

Pentavalente (México) = DTP, HIB y Hepatitis B

ProQuad = Varicela y MMR

Kinrix = DTP y IPV (Solamente dado para el refuerzo por 4 – 6 años)

MCV = Vacuna antimeningocócica conjugada

Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Guilford, División de Salud Pública al (336) 641-7777 o www.myguilford.com.